

DAKIN COOPER®

STABILISÉ

- **COMPOSITION :**

Solution concentrée d'hypochlorite de sodium quantité correspondant à chlore actif 0,5 g pour 100 ml. Permanganate de potassium, dihydrogénophosphate de sodium dihydraté, eau purifiée.

- **INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES :**

Antiseptique local préconisé dans l'antiseptie de la peau, des muqueuses et des plaies. Usage externe.

À utiliser pur en lavages, bains locaux, irrigations, ou en compresses imbibées ou pansements humides. Renouveler les applications selon les besoins. **Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Lire attentivement la notice avant utilisation.**

À conserver à une température inférieure à 30°C.

Médicament non soumis à prescription médicale.



IDENTIFICATION DU MÉDICAMENT :

• COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE :

Solution concentrée d'hypochlorite de sodium quantité correspondant à chlore actif : 0,500 g pour 100 ml. Permanganate de potassium, dihydrogénophosphate de sodium dihydraté, eau purifiée.

• FORME PHARMACEUTIQUE :

Solution pour application locale : flacon en polyéthylène de 60 ml, 250 ml, 500 ml.

• CLASSE PHARMACO- THÉRAPEUTIQUE :

Antiseptique (D : Dermatologie)

• TITULAIRE / EXPLOITANT :

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE
FRANÇAISE

Place L. Auvert – 77020 Melun Cedex

• FABRICANT :

COOPÉRATION PHARMACEUTIQUE
FRANÇAISE - Rue de la Saussaie
77310 St Fargeau-Ponthierry

DANS QUELS CAS UTILISER CE MÉDICAMENT ?

(indications thérapeutiques)

Ce médicament est un antiseptique local à usage externe.

Ce médicament est préconisé dans :

- l'antisepsie de la peau et des muqueuses,
- l'antisepsie des plaies

ATTENTION !

- DANS QUELS CAS NE PAS
UTILISER CE MÉDICAMENT ?**

EN CAS DE DOUTE , IL EST INDISPENSABLE DE DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

Ne pas avaler. Ne pas utiliser en même temps qu'un autre antiseptique.

Attention : risque de décoloration de certaines fibres textiles.

EN CAS DE DOUTE NE PAS HÉSITER À DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉDECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN.

• INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES ET AUTRES INTERACTIONS :

Compte tenu des interférences possibles (antagonisme, inactivation), l'emploi simultané ou successif d'antiseptiques ou de savon est à éviter sans un rinçage soigneux intermédiaire.

AFIN D'ÉVITER D'ÉVENTUELLES INTERACTIONS ENTRE PLUSIEURS MÉDICAMENTS, SIGNALEZ SYSTÉMATIQUEMENT TOUT AUTRE TRAITEMENT EN COURS À VOTRE MÉDECIN OU À VOTRE PHARMACIEN.

• GROSSESSE - ALLAITEMENT :
D'UNE FAÇON GÉNÉRALE, IL CONVIENT
AU COURS DE LA GROSSESSE OU
DE L'ALLAITEMENT DE TOUJOURS
DEMANDER L'AVIS DE VOTRE MÉ-
DECIN OU DE VOTRE PHARMACIEN
AVANT D'UTILISER UN MÉDICAMENT.

COMMENT UTILISER CE MÉDICAMENT ?

• POSOLOGIE : Les applications locales
de DAKIN COOPER® STABILISÉ se
font sans dilution, soit :

- en lavages (ex : lavage des plaies),
- en bains locaux (ex : bains de doigts,
de pieds, de siège),
- en irrigations,
- en compresses imbibées
ou en pansements humides.

Renouveler les applications selon les
besoins.

• MODE ET VOIE D'ADMINISTRATION :
Usage externe.

**TENIR HORS DE LA PORTÉE ET DE
LA VUE DES ENFANTS.**

CONDUITE À TENIR EN CAS DE SURDOSAGE :

En cas d'ingestion accidentelle, l'anti-
dote est le bicarbonate de sodium.

EFFETS NON SOUHAITÉS ET GÊNANTS :

COMME TOUT PRODUIT ACTIF, CE MÉ-
DICAMENT PEUT ENTRAÎNER CHEZ
CERTAINES PERSONNES DES EFFETS
PLUS OU MOINS GÊNANTS :

- Possibilité de sensations de brûlures ou
d'irritation (en cas de plaies importantes ou en
chirurgie gynécologique) ; ceci est habi-
tuellement sans conséquence et ne doit en
général pas faire modifier le traitement.
- Risque d'effet irritatif sous occlusion
prolongée.

**SIGNEZ À VOTRE MÉDECIN OU À
VOTRE PHARMACIEN TOUT EFFET NON
SOUHAITÉ ET GÊNANT QUI NE SERAIT
PAS MENTIONNÉ DANS CETTE NOTICE.**

CONSERVATION :

Ne pas dépasser la date limite d'utilisation
figurant sur le flacon.

PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES DE CONSERVATION :

A conserver à une température inférieure
à 30°C.

DATE DE RÉVISION DE LA NOTICE :

Février 2005

